

## **Beitrag zur Kenntnis der Grabwespenfauna Nord-Griechenlands**

**(Hymenoptera, Sphecidae)**

Von **Konrad Schmidt und Paul Westrich**

### **Abstract**

A contribution to the knowledge of sphecid wasps in Northern Greece (Hym., Sphecidae).

66 species of sphecid wasps were collected by P. Westrich in August 1981 and August 1982 in Northern Greece. The following 6 species have previously not been recorded from Greece: *Passaloecus singularis*, *Astata apostata*, *Astata brevitarsis*, *Tachysphex obscuripennis gibbus*, *Oxybelus bipunctatus*, *Oxybelus lamellatus*. The hitherto unknown male of *Astata brevitarsis* is described.

### Zusammenfassung

Zwei Sammelreisen nach Nord-Griechenland im August 1981 und August 1982 erbrachten 66 Grabwespen-Arten. Folgende 6 Arten sind neu für die Fauna Griechenlands: *Passaloecus singularis*, *Astata apostata*, *Astata brevitarsis*, *Tachysphex obscuripennis gibbus*, *Oxybelus bipunctatus*, *Oxybelus lamellatus*. Von *Astata brevitarsis* wird das bisher unbekannte Männchen beschrieben.

Aus Griechenland sind bisher 279 Grabwespen-Arten bekannt (B e a u m o n t 1960, 1965, G u i c h a r d 1978). Bei der Auswertung der älteren faunistischen Literatur hat B e a u m o n t (1965) offenbar die Arbeiten von B e r l a n d (1921) und M a i d l (1934) übersehen. Von den dort aufgeführten 26 griechischen Arten wird lediglich *Ectemnius walteri* (Kohl) in den oben zitierten Arbeiten nicht erwähnt. *E. walteri* ist sonst nur aus dem Kaukasus-Gebiet bekannt.

Aus Nord-Griechenland lagen bisher vergleichsweise wenig Funde, hauptsächlich aus der Umgebung von Thessaloniki, vor. P. W e s t r i c h sammelte im August 1981 bei einem Kurzaufenthalt und im August 1982 auf einer dreiwöchigen Rundreise akuleate Hymenopteren, darunter 240 Grabwespen in 66 Arten. 6 Arten sind neu für die Fauna Griechenlands, darunter das bisher unbeschriebene Männchen von *Astata brevitarsis* Pulawski. Das Material befindet sich in der Sammlung K. S c h m i d t , Dubletten in der Sammlung P. W e s t r i c h .

### Verzeichnis der Fundorte (vgl. Abb. 1):

1. Peramos, Kavala, 6. 8. 1982. Sandiges Ödland am Rande einer Phrygana (Garrigue).
2. Stavros, Kavala, 7. 8. 1982. Sandiges Ödland am Rande einer Ortschaft und in einer Cistrosen-Macchie.
3. Kinira, Thasos, 10. 8. 1982. Sandiges Brachland unter Oliven mit *Eryngium campestre* und *Mentha longifolia*.
4. Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982. a) Dünen am Strand mit *Eryngium maritimum*; b) sandiges Brachland zwischen Olivenhainen mit *Eryngium campestre* und *Mentha longifolia*; c) Cistrosen-Macchie im Saum eines Pinien-Waldes.  
(Die Insel Thasos, die sich als artenreich erwies, wurde offensichtlich noch nie von einem Hymenopterologen besucht)
5. Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982. Hügeliges Gelände mit Löß überdeckt. Kleine Baumgruppen. Stark beflogen war ein etwa 100 m<sup>2</sup> großer Bestand von *Daucus carota*.
6. Edessa, 17. 8. 1982. Brombeerhecke und Felswand bei den Wasserfällen.
7. Kella, Edessa, 700 m N. N., 17. 8. 1982. Felssteppe mit vereinzelten *Juniperus*-Büschen.
8. Gavros, N Kastoria, 18. 8. 1982. Sandige Flussufer-Böschung mit *Mentha longifolia*.
9. Kastoria, 18. 8. 1982. In der Stadt.
10. Kostarazi, S Kastoria, 18. 8. 1982. Brachland mit viel *Eryngium campestre*.
11. Zagora, Pilion-Gebirge bei Volos, 20.—22. 8. 1982. a) 550 m N. N., sandige Böschung im Saum eines Kastanien-Waldes; b) 600 m N. N., Böschung in der Phrygana; c) 800 m N. N., aufgelassener Steinbruch mit Sandflächen.
12. Vasilika, Chalkidiki, 23. 8. 1982. Schüttber bewachsene Sandflächen.
13. Herson, Kilkis, 9. 8. 1981. Brachland in der Flusseine mit lichtem Auwald und *Mentha longifolia*. An einer Lehmziegelmauer in der Ortschaft.
14. Evzoni, 19. 9. 1967 (leg. K i n z e l b a c h ).
15. Kalochorion, W Thessaloniki, 1. 10. 1963 und Gallikos-Mündung 17. 8. 1971 (leg. K i n z e l b a c h ).
16. Cholomon-Berge, Chalkidiki, 850 m N. N., 19. 8. 1971 (leg. K i n z e l b a c h ).
17. Nea Phokaia, Kassandra, Chalkidiki, 15. 8. 1971 (leg. K i n z e l b a c h ).

Die Tiere von den Fundorten 14.—17. verdanken wir Herrn Prof. Dr. R. K i n z e l b a c h (Darmstadt).

### Artenliste

Anordnung der Gattungen und Nomenklatur nach Bohart & Menke (1976). Innerhalb der Gattungen alphabetische Reihenfolge.

1. ***Sceliphron destillatorium*** (Illiger)  
1 ♀ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981 an einer Lehmziegelmauer.
2. ***Sceliphron madraspatanum tubifex*** (Latreille)  
2 ♀♀ Gallikos-Mündung, W Thessaloniki, 17. 8. 1971 (leg. Kinzelbach).
3. ***Sceliphron spirifex*** (Linné)  
1 ♂, 1 ♀ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981 an einer Lehmziegelmauer; 1 ♂ Kastoria, 18. 8. 1982; 1 ♂ Nea Phokaia, Kassandra, 15. 8. 1971 (leg. Kinzelbach).
4. ***Sphex flavipennis*** Fabricius  
1 ♀ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981 an *Eryngium campestre*; 1 ♀ Potamia, Thasos 10.—14. 8. 1982 auf Brachland zwischen Oliven an *Eryngium*; 1 ♀ Vasilika, Chalkidiki, 23. 8. 1982 an *Eryngium campestre*.
5. ***Sphex pruinosus*** Germar  
3 ♂♂ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981; 1 ♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen an *Eryngium maritimum*; 1 ♀ Kinira, Thasos, 10. 8. 1982.
6. ***Sphex rufocinctus*** Brullé (*maxillosus* F.)  
3 ♂♂ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981; 2 ♂♂ Stavros, Kavala, 7. 8. 1982; 1 ♀ Kinira, Thasos, 10. 8. 1982; 2 ♂♂, 1 ♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen an *Eryngium maritimum* und auf Brachland an *Eryngium campestre*; 2 ♂♂ Kella, Edessa, 700 m, 17. 8. 1982 an *Eryngium campestre*; 1 ♂ Vasilika, Chalkidiki, 23. 8. 1982.




Abb. 1: Lage der Fundorte in Nord-Griechenland (1 Peramos, 2 Stavros, 3 Kinira, 4 Potamia, 5 Komnina, 6 Edessa, 7 Kella, 8 Gavros, 9 Kastoria, 10 Kostarazi, 11 Zagora, 12 Vasilika, 13 Herson, 14 Evzoni, 15 Kalochorion, 16 Cholomon, 17 Nea Phokaia).

7. **Prionyx kirbii** (van der Linden) (*albisectus* Lep. & Serv.)  
1 ♀ Stavros, Kavala, 7. 8. 1982; 1 ♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 auf Brachland an *Eryngium campestre*; 3 ♂♂, 1 ♀ Zagora, Volos, 800 m, 21. 8. 1982.
8. **Prionyx lividocinctus** (A. Costa)  
1 ♂ Kinira, Thasos, 10. 8. 1982; 1 ♀ Potamia, Thasos, 13. 8. 1982.
9. **Podalonia tydei** Le Guillou  
1 ♀ Kalochorion, W Thessaloniki, 1. 10. 1963 (leg. K i n z e l b a c h ).
10. **Ammophila campestris** Latreille  
2 ♂♂, 1 ♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982.
11. **Ammophila heydeni** Dahlbom  
1 ♂ Peramos, Kavala, 6. 8. 1982; 1 ♀ Stavros, Kavala, 7. 8. 1982; 1 ♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 auf Brachland an *Eryngium campestre*; 2 ♀♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982; 1 ♀ Kastoria, 18. 8. 1982; 1 ♀ Zagora, Volos, 550 m, 20.—22. 8. 1982.
12. **Ammophila sabulosa** (Linneé)  
1 ♀ Cholomon, Chalkidiki, 850 m, 19. 8. 1971 (leg. K i n z e l b a c h ). 1 ♂ Zagora, Volos, 800 m, 20.—22. 8. 1982.
13. **Diodontus minutus** (Fabricius)  
2 ♂♂, 1 ♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982; 5 ♂♂, 6 ♀♀ Zagora, Volos, 550 m und 600 m, 20.—22. 8. 1982.
14. **Pemphredon inornata** (Say)  
1 ♂ Edessa, 17. 8. 1982. — Beaumont (1965) nennt nur einen alten Fund von Korfu.
15. **Pemphredon lethifer** (Fabricius)  
1 ♂ Peramos, Kavala, 6. 8. 1982; 1 ♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 an *Rubus*; 1 ♀ Komnina, Stravroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982; 1 ♀ Edessa, 17. 8. 1982 an *Rubus*.
16. **Passaloecus singularis** Dahlbom  
1 ♀ Komnina, Stravroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982 an *Daucus carota*. — Neu für Griechenland!
17. **Astata apostata** Mercet  
2 ♂♂ Potamia, Thasos, 13. 8. 1982. — Mediterrane Art, die von NW-Afrika und Spanien bis in die Tschechoslowakei verbreitet ist (P u l a w s k i 1955). — Neu für Griechenland!
18. **Astata brevitarsis** Pulawski  
1 ♀ Zagora, Volos, 550 m, 21. 8. 1982; 1 ♂ Zagora, Volos, 800 m, 21. 8. 1982. — Bisher sind offenbar nur 2 ♀♀ bekannt: Dömsöd/Ungarn (P u l a w s k i 1958) und Denizli/Türkei (P u l a w s k i 1967). Westrich fand am 21. 8. 1982 außerhalb von Zagora außer einem ♀ auch ein *Astata minor* nahestehendes ♂, das wir für das noch unbeschriebene ♂ von *A. brevitarsis* halten. Wenn auch die Funde aus unterschiedlichen Höhen stammen, so waren doch der geologische Untergrund, die Vegetation sowie die Begleitfauna der beiden Biotope nahezu identisch. — Neu für Griechenland!

Das *Astata brevitarsis* ♂ unterscheidet sich von dem sehr ähnlichen *Astata minor* ♂ wie folgt:

*brevitarsis*

Geißelglieder 5—9 im Profil gleichmäßig vorgewölbt (Abb. 2).

Tyloide in Aufsicht als schmaler Grat über die ganze Länge der Geißelglieder 5—9 verlaufend, an den Enden meist deutlich aufgehellt (Abb. 3).

Mittelhüften innen ohne Konkavität. Behaarung auf der Unterseite der Hinterschenkel länger und weniger dicht.

Bauchbürste auf Sternit 4—6 aus lokker stehenden Haaren zusammengesetzt; die mittleren Haare nicht kürzer als die seitlichen.

*minor*

Geißelglieder 5—9 im Profil in der Mitte tuberkelartig erhöht (Abb. 4).

Tyloide in Aufsicht als ovaler Tuber-  
kel in der Mitte der Geißelglieder  
5—9 (Abb. 5). Die Geißelglieder am  
Ende wulstartig verdickt.

Mittelhüften innen mit einer mehr  
oder weniger deutlich ausgeprägten  
Konkavität.

Behaarung auf der Unterseite der  
Hinterschenkel kürzer und dichter.

Bauchbürste auf Sternit 4—6 aus  
dichter stehenden Haaren zusam-  
men-  
gesetzt; die mittleren Haare kürzer  
als die seitlichen.

Während das ♀ von *A. brevitarsis* ein ganz rotes Abdomen besitzt, ist das ♂ ähnlich dem von *A. minor* gefärbt: Tergit 1 mit schwarzer Basis, Tergite 4—6 schwarz mit durchscheinenden Hinterrändern. Die Genitalien der beiden Arten sind kaum von einander zu unterscheiden.

In den Tabellen von Pulawski (1955) und Balthasar (1972) gelangt man beim Bestimmen der ♂♂ zu *Astata boops*, von der sich *A. brevitarsis* aber durch abweichenden Fühlerbau unterscheidet (Fühlergeißelglieder von *A. boops* länger, im Profil in der Mitte schwach eingebuchtet).




Abb. 2—5: 2: *Astata brevitarsis* ♂, Fühlergeißel im Profil. — 3: *A. brevitarsis* ♂,  
7. Geißelglied, Unterseite. — 4: *A. minor* ♂, Fühlergeißel im Profil. — 5: *A. minor* ♂,  
7. Geißelglied, Unterseite.

19. ***Astata costae* A. Costa (costae Piccioli)**

2 ♂♂ Potamia, Thasos, 13. 8. 1982; 1 ♂ Zagora, Volos, 550 m, 21. 8. 1982.

20. ***Dryudella tricolor eurygnatha* Pulawski**

1 ♀ Zagora, Volos, 600 m, 22. 8. 1982.

21. ***Dinetus pictus* (Fabricius)**

1 ♀ Komnina, Stravoupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982 an *Daucus carota*.

22. **Tachytes etruscus** (Rossi)  
1 ♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen. — Beaumont (1963) zitiert lediglich nahezu 100 Jahre zurückliegende Funde aus Athen, Mystras (Peleponnes) und Korfu.
23. **Tachytes europaeus** Kohl  
1 ♂ Kinira, Thasos, 10. 8. 1982.
24. **Tachysphex consocius** Kohl (*cabrerai* Mercet)  
1 ♂ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982.
25. **Tachysphex fugax** (Radoszkowski) (*filicornis* Kohl)  
1 ♀ Edessa, 17. 8. 1982.
26. **Tachysphex fulvitarsis** (A. Costa)  
1 ♀ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981; 1 ♀ Potamia, Thasos, 13. 8. 1982; 1 ♂ Zagora, Volos, 550 m, 20. 8. 1982.
27. **Tachysphex incertus** (Radoszkowski) (*pygidialis* Kohl)  
2 ♀♀ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981; 1 ♂, 4 ♀♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 auf Brachland; 2 ♂♂ Potamia, Thasos, 13. 8. 1982 auf einer Lichtung im Pinienwald; 1 ♀ Peramos, Kavala, 6. 8. 1982; 3 ♀♀ Kella, Edessa, 700 m, 17. 8. 1982.
28. **Tachysphex obscuripennis gibbus** Kohl  
1 ♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen. — Pulawski (1971) betrachtet *gibbus* als eine Unterart von *obscuripennis*. — Neu für Griechenland!
29. **Tachysphex panzeri** (van der Linden)  
2 ♀♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982.
30. **Tachysphex pompiliformis** (Panzer)  
1 ♀ Zagora, Volos, 800 m, 20.—22. 8. 1982.
31. **Tachysphex tarsinus** (Lepeletier)  
2 ♂♂ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982.
32. **Tachysphex tesselatus** (Dahlbom)  
1 ♂, 1 ♀ Kinira, Thasos, 10. 8. 1982; 3 ♂♂, 2 ♀♀ Potamia, Thasos 10.—14. 8. 1982 in den Dünen und auf Brachland. — Beaumont (1960) hält *tesselatus* lediglich für eine Form von *panzeri*. Pulawski (1971) erkennt ihr jedoch Artstatus zu.
33. **Tachysphex unicolor** (Panzer)  
1 ♂ Gavros, Kastoria, 18. 8. 1982.
34. **Prosopigastra orientalis** Beaumont  
1 ♀ Kinira, Thasos, 10. 8. 1982.
35. **Trypoxyylon scutatum** Chevrier  
1 ♀ Evzoni, 19. 9. 1967 (leg. K inzelbach).
36. **Oxybelus bipunctatus** Olivier  
1 ♂ Potamia, Thasos, 13. 8. 1982 auf Brachland an *Mentha longifolia*. — Neu für Griechenland!
37. **Oxybelus lamellatus** Olivier  
2 ♂♂ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981 an *Mentha longifolia*. — Die nächstgelegenen Fundorte befinden sich auf Cypern (Pittioni 1949) und in Kleinasien (Beaumont 1967). — Neu für Griechenland!
38. **Oxybelus maculipes** Smith  
2 ♂♂, 2 ♀♀ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981 an *Mentha longifolia*; 8 ♂♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen; 1 ♀ Potamia, Thasos, 13. 8. 1982 auf Brachland an *Mentha longifolia*.

39. **Oxybelus mucronatus** (Fabricius)  
 2♂♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 auf Brachland an *Mentha longifolia*; 1♂ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982 an *Daucus carota*; 1♂ Gavros, Kastoria, 18. 8. 1982 an *Mentha longifolia*; 1♂ Zagora, Volos, 550 m, 21. 8. 1982.
40. **Oxybelus quatuordecimnotatus** Jurine  
 1♂ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981 an *Mentha longifolia*; 1♀ Potamia, Thasos, 13. 8. 1982.
41. **Oxybelus variegatus** Wesmael  
 2♂♂ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981; 1♂ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982 an *Daucus carota*.
42. **Oxybelus victor** Lepeletier  
 1♂, 1♀ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981; 1♂ Potamia, Thasos, 13. 8. 1982; 1♂ Zagora, Volos, 550 m, 20. 8. 1982.
43. **Entomognathus brevis** (van der Linden)  
 1♂ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982.
44. **Lindenius albilabris** (Fabricius)  
 1♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen.
45. **Lindenius pygmaeus armatus** (van der Linden)  
 1♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982 an *Daucus carota*.
46. **Crossocerus elongatulus** (van der Linden)  
 1♂ Kastoria, 18. 8. 1982.
47. **Ectemnius continuus** (Fabricius)  
 1♂, 1♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982.
48. **Lestica clypeata** (Schreber)  
 1♂, 2♀♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982; 1♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982; 1♀ Gavros, Kastoria, 18. 8. 1982.
49. **Nysson** spec.  
 1♀ Zagora, Volos, 21. 8. 1982. — Bei diesem Exemplar handelt es sich wahrscheinlich um eine noch unbeschriebene Art der *variabilis*-Gruppe (vgl. Beaumont 1965: 38f).
50. **Gorytes quinquecinctus** Fabricius  
 1♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982.
51. **Ammatomus coarctatus** (Spinola)  
 1♂ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982.
52. **Psammaecius punctulatus** (van der Linden)  
 2♂♂, 1♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen und auf Brachland.
53. **Stizus ruficornis** (J. Forster) (*pubescens* Klug)  
 2♂♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen an *Eryngium maritimum*.
54. **Bembecinus hungaricus** Frivaldszky  
 1♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen; 1♂, 1♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982 an *Daucus carota*.
55. **Bembecinus tridens** (Fabricius)  
 3♂♂, 3♀♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen und auf Brachland; 2♂♂, 4♀♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982 an *Daucus carota*.
56. **Bembix cinctella** Handlirsch  
 1♀ Vasilika, Chalkidiki, 23. 8. 1982 an *Eryngium campestre*.

57. **Bembix oculata** Panzer

1 ♀ Peramos, Kavala, 6. 8. 1982; 1 ♀ Kinira, Thasos, 10. 8. 1982 an *Mentha longifolia*; 2 ♀♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen an *Eryngium maritimum* und auf Brachland an *Eryngium campestre*; 1 ♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982 an *Eryngium campestre*; 1 ♀ Vasilika, Chalkidiki, 23. 8. 1982 an *Eryngium campestre*.

58. **Bembix turka** Dahlbom

5 ♂♂, 1 ♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen an *Eryngium maritimum* und auf Brachland an *Eryngium campestre*. — Beaumont (1965) zitiert von dieser seltenen Art lediglich nahezu 100 Jahre zurückliegende Funde aus Epirus.

59. **Philanthus triangulum** (Fabricius)

An allen Fundorten sehr häufig.

60. **Philanthus venustus** (Rossi)

1 ♂, 1 ♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen.

61. **Cerceris arenaria** (Linné)

1 ♂ Stavros, Kavala, 7. 8. 1982; 1 ♂ Kinira, Thasos, 10. 8. 1982; 3 ♂♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982; 4 ♂♂ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982.

62. **Cerceris circularis dacica** Schletterer

2 ♂♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982.

63. **Cerceris interrupta** Panzer

1 ♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen; 1 ♂ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982 an *Daucus carota*. — Beaumont (1965) hat keine griechischen Exemplare gesehen. Er nennt lediglich Funde vom Mt. Pilion und von Korfu. Maidl (1934) meldet die Art von Siphnos.

64. **Cerceris odontophora** Schletterer

1 ♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982.

65. **Cerceris quadricincta** Panzer

1 ♂ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981; 1 ♀ Kella, Edessa, 700 m, 17. 8. 1982.

66. **Cerceris rubida** Jurine

1 ♀ Herson, Kilkis, 9. 8. 1981; 1 ♀ Stavros, Kavala, 7. 8. 1982; 2 ♂♂, 4 ♀♀ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982 in den Dünen und auf Brachland; 1 ♀ Komnina, Stavroupolis, W Xanthi, 14. 8. 1982; 1 ♀ Kostarazi, S Kastoria, 18. 8. 1982; 2 ♂♂, 1 ♀ Vasilika, Chalkidiki, 23. 8. 1982.

67. **Cerceris rybyensis** (Linné)

1 ♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982.

68. **Cerceris sabulosa** (Panzer)

1 ♂ Herson, Kilkis, 9. 9. 1981; 2 ♂♂ Potamia, Thasos, 10.—14. 8. 1982; 2 ♀♀ Kella, Edessa, 700 m, 17. 8. 1982; 2 ♂♂ Gavros, Kastoria, 18. 8. 1982; 1 ♂, 1 ♀ Kastoria, 18. 8. 1982 an *Eryngium campestre*; 3 ♂♂ Vasilika, Chalkidiki, 23. 8. 1982.

69. **Cerceris specularis** Costa

1 ♂ Kostarazi, S Kastoria, 18. 8. 1982 an *Eryngium campestre*.

### Literatur

- Balthasar, V. (1972): Grabwespen — Sphecoidea. — Fauna CSSR, 20 p. 1—471, Praha.
- Beaumont, J. de (1960): Sphecidae de l'île de Rhodes (Hym.). Mitt. schweiz. ent. Ges., 33 p. 1—26.
- — (1965): Les Sphecidae de la Grèce. Mitt. schweiz. ent. Ges., 38 p. 1—65.
- — (1967): Hymenoptera from Turkey. Sphecidae I. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Ent., 19 p. 253—382.
- Berland, L. (1921): Travaux scientifiques de l'Armée d'Orient (1916—1918). Hyménoptères Fouisseurs. Bull. Mus. Hist. Paris, 27 p. 531—533.
- Bohart, R. M. & Menke, A. S. (1976): Sphecid wasps of the world. A generic revision. 695 pp. Berkeley, Los Angeles, London.
- Guichard, K. M. (1978): Additions to the Greek wasp fauna (Hymenoptera, Sphecidae). Ann. Mus. Goulandris, 4 p. 267—272.
- Maidl, F. (1934): Liste der von Univ.-Prof. Dr. Franz Werner und Kustos Dr. Otto Wettstein im Jahre 1934 auf den Ägäischen Inseln gesammelten Scoliiden, Psamnocháriden und Sphegidén (Hym.), Sitzber. Akad. Wiss. Wien Math.-Naturw. Kl., 143 p. 288—290.
- Pittioni, B. (1950): On the insect fauna of Cyprus. Results of the expedition of 1939 by Harald, Håkan and P. H. Lindberg. V. Hymenoptera aculeata. 1. Diptera, Fossores und Apoidea der Insel Cypern. Comment. Biol., 10, No. 12 p. 1—94.
- Pulawski, W. J. (1955): Les espèces européennes du genre Astata Latr. (Hym., Sphecid.). Pol. Pismo Ent., 25 p. 33—71.
- — (1958): Deux espèces nouvelles du genre Astata Latr. (Hym., Specid.) de Hongrie. Pol. Pismo Ent., 27 p. 193—197.
- — (1967): Hymenoptera from Turkey. Sphecidae, II (Genera Astata Latreille and Tachysphex Kohl). Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Ent., 19 p. 385—410.
- — (1971): Les Tachysphex Kohl (Hym., Sphecidae) de la région paléarctique occidentale et centrale. 464 pp. Wrocław.

#### Anschriften der Verfasser:

Prof. Dr. Konrad Schmidt, Zool. Institut der Universität,  
Kornblumenstraße 13, D-7500 Karlsruhe 1  
Dr. Paul Westrich, Eduard-Spranger-Straße 41,  
D-7400 Tübingen